

Zaterdag 6 september

Witbeek

Visinventarisatie op de Witbeek te Kinrooi en Maaseik

Samenkomst aan de kerk van Geistingen om 9.00 uur.

Volgende trajecten worden onderzocht:

1. Witbeek thv Kollegreend
2. Witbeek thv de RWZI in het gebied Boterakker aan de Vilgertenweg
3. Witbeek aan de stuw in Geistingen thv de Spaanjerd
4. Witbeek opwaarts de stuw in Geistingen
5. Witbeek in Ophoven thv de Leustraat (thv de kapel)
6. Witbeek thv de Weertersteenweg

	Meetpunt 1	2	3	4	5	6
Baars	15	4	9	30	8	
Berm	8	95		5	21	
Blankvoorn	10	8		3	1	
Blauwbandgrondel	31	8	2		1	
Driedoorn. Stb.	300	897	270	10	7	7
Kolblei		1				
Kopvoorn	2					
Marmergroundel			15			
Paling						1
Rietvoorn		4				
Riviergrondel	3				10	
Serpeling	3					
Snoek		1		1		2
Tiendoorn. Stb.	6	6	20			3
Winde	7	2				
Zeelt	1		1			
Zonnebaars		2	3			1
Zwartbekgrondel			6			

Meetpunt 1: Bij een ietwat mistige start beginnen we er aan, en ja, we hebben er zin in!





Al vlug zwemmen de eerste vissen in onze kuip:

2 prachtige kopvoorns van 24 en 32 cm




7 windes van 13 tot 22 cm



En wat dacht u van deze zeelt van 20 cm?



10 blankvoorns van 8 tot 15 cm



En verder een driehonderdtal driedoornige stekelbaarsjes, 15 baarzen, 8 berrmpjes, 3 serpelingen en nog enkele rivier- en blauwbandgrondels



Meetpunt2:



Bijna 900 driedoornige stekelbaarsjes, een honderdtal berrmpjes van ca 6 cm, één snoekje van 24 cm, 2 windes, 2 rietvoorns, 8 blankvoorns en een

kolblei van 9 cm



Meetpunt 3 en 4:



15 marmmergrondels



Discussie... is het nu een zwartbek- of een marmergrondel?



Voor een aantal onder ons de eerste confrontatie met deze 2 vissoorten!



De Marmergrondel behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae).

Het lichaam is gedrongen en donkerbruin tot donkergrijs met een gemarmerde tekening met daarin grote donkere vlekken. Mannetjes kleuren in de paaitijd bijna zwart, de voorste rand van hun eerste rugvin kleurt oranje en de rand van de tweede rugvin en staartvin kleuren wit tot rood. De soort kan ruim 10 cm worden.

De marmergrondel verschilt van onze inheemse rivier- en beekdonderpad doordat de borstvinnen van de marmergrondel vergroeid zijn tot een zuignap, bij de donderpadden zijn deze vinnen gescheiden.

De marmergrondel onderscheidt zich van de zwartbekgrondel doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, de andere grondelsoorten hebben dit niet.

Door zijn sterke kolonisedrift vormt de soort mogelijks een bedreiging voor inheemse bodemsoorten zoals rivierdonderpad en bermpje

De marmergrondel heeft zich vanuit zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied rond de Kaspische en Zwarte Zee via de Donau steeds verder uitgebreid naar West-Europa. In 1985 werd de soort voor het eerst waargenomen in de bovenloop van de Donau, in 2000 was de grondel tot Bonn gevorderd en in het voorjaar van 2002 bleek de soort in Nederland gearriveerd.

In België is de soort voor het eerst aangetroffen in 2009, in de Maas In 2010 werd de vis ook in Vlaanderen aangetroffen

Meetpunt 5:

Voor een goede vangst, soms in moeilijke omstandigheden, vlug een kaarsje branden in de nabijgelegen kapel!



Driedoornige stekelbaars, baars, riviergrondel en blauwbandgrondel



Mooie riviergrondel van 14 cm



Nog even verbroederen met de buurt



en dan naar ... **Meetpunt 6:**

waar we dit visonderzoek afsluiten met een mooie paling van 62 cm



Guido Jansen

