

Vergeet-mij-nietje (*Myosotis*)

ALGEMENE SLEUTEL


- Kelk met afstaande haren, onderaan met haakvormige top; **droge plaatsen**
 - Zoom bloemkroon vlak, middellijn 5 mm of meer **Bosvergeet-mij-nietje**
 - Zoom bloemkroon trechtervormig, middellijn kleiner dan 5 mm
 - Vruchtsteel recht, 2-3x lengte vruchtkelk **Akkervergeet-mij-nietje**
 - Vruchtsteel even lang als of korter dan de vruchtkelk
 - Vruchtsteel gebogen (hoek 60-90°), even lang als open vruchtkelk **Ruw vergeet-mij-nietje**
 - Vruchtsteel recht en kort, helft van gesloten vruchtkelk
 - Bloem veelkleurig, kroonbuis 1,5x kelk; steeltje hoek van 45-60° **Veelkleurig vergeet-mij-nietje**
 - Bloem blauw, kroonbuis=kelk; steeltje kort <45° **Stijf vergeet-mij-nietje**
- Kelk met rechte, aangedrukte haren; **vochtige plaatsen**
 - Kelk halve hoogte ingesneden; kroon 4-5 mm **Zompvergeet-mij-nietje**
 - Kelk 25-40% hoogte ingesneden; kroon 4-8 mm
 - Haren onderste bladen naar bladvoet wijzend; kroon 4-5 mm **Weidevergeet-mij-nietje**
 - Haren onderste bladen naar bladtop wijzend; kroon 4-8 mm **Moerasvergeet-mij-nietje**

Vergeet-mij-nietje (*Myosotis*)

- Vergeet-mij-nietjes van **droge bodems**

Stijf vergeet-mij-nietje

(*Myosotis stricta*)




Akkervergeet-mij-nietje

(*Myosotis arvensis*)




Veelkleurig vergeet-mij-nietje

(*Myosotis discolor*)



Ruw vergeet-mij-nietje

(*Myosotis ramosissima*)




Vergeet-mij-nietje (*Myosotis*)

- Vergeet-mij-nietjes van **vochtige bodems**

Zompvergeet-mij-nietje

(*Myosotis cespitosa*)



bloem
2-5 mm

tot ong. 1/2
Ingesneden
diep



Moerasvergeet-mij-nietje

(*Myosotis scorpioides*)



bloem
4-8 mm

1/4 -2/5
ingesneden
ondiep



haren
onderkant blad
naar **top**
wijzend

Weidevergeet-mij-nietje

(*Myosotis nemorosa*)



kantige stengel
meer glanzende
plant

kroonbladen voor de
helft overlappend
haren onderkant blad
naar **voet** wijzend



Bosvergeet-mij-nietje (*Myosotis sylvatica*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Kroonlippen recht afstaand, samen vlak tot schotelvormig, 5-8 mm breed, lichtblauw (bij tuinplanten soms roze blijvend). Niet-bloeiende, tamelijk grootbladige rozetten aanwezig.

Hoogte bloeiende plant

10 – 50 cm.

Bloeitijd

Mei – juni (– september)

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)


Standplaats

Bossen met rijke, milde humus, wegbermen in het bos, kapvlakten.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	104	104
●	1995 - ...	76	76



Stijf vergeet-mij-nietje (*Myosotis stricta*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bladen van onderen aan de voet van de middennerf met haakvormig gekromde haren.

Vruchtstelen een hoek van hoogstens 45° makend met de as van de bloeiwijze, recht, ca. 1 mm lang.

Vruchtkelk in zijaanzicht langwerpig tot elliptisch.

Bloemkroon 1,5-2 mm in doorsnede, lichtblauw

Hoogte bloeiende plant

5 – 20 (– 30) cm.

Bloeitijd

April – juni

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)

Standplaats

Open graslanden op droge bodem, korenvelden op zand.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	12	12
●	1995 - ...	3	3



Akkervergeet-mij-nietje (*Myosotis arvensis*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Kroonslippen iets schuin rechtopstaand, samen komvormig, 2-4(-5) mm breed, lichtblauw.

Geen grootbladige bladrozetten aanwezig.

Hoogte bloeiende plant

10 – 60 cm.

Bloeitijd

(April –) Mei – oktober

Levensvorm

Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)


Standplaats

Korenvelden, bouwland, braakland.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	1	4
●	1971-'94	358	70
●	1995 - ...	156	11



Ruw vergeet-mij-nietje (*Myosotis ramosissima*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Vruchtstelen 1-4 mm lang, een hoek van 60°-90° makend met de as van de bloeiwijze, vaak gekromd.

Bloeiwijze in de vruchttijd meestal langer dan de bebladerde stengel.

Bloemkroon 1,5-3 mm breed, hemelsblauw.

Hoogte bloeiende plant

5 – 30 cm.

Bloeitijd

April – juni

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Open, droge graslanden.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	105	105
●	1995 - ...	51	51



Veelkleurig vergeet-mij-nietje (*Myosotis discolor*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bloemkroon eerst lichtgeel, later bleekblauw; kroonbuis tenslotte meestal duidelijk buiten de kelk uitstekend, van buiten vaak roodachtig.

Bladen van onderen met rechte haren.

Vruchstelen een hoek van 45°-60° makend met de as van de bloeiwijze, recht.

Vruchtkelk in zijaanzicht omgekeerd eirond.

Hoogte bloeiende plant

10 – 30 (– 50) cm.

Bloeitijd

Mei – juni (– augustus)

Levensvorm

Therofyt (eenjarig)


Standplaats

Korenvelden op leemzand, open graslanden.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	2	2
●	1971-'94	76	76
●	1995 - ...	30	30



Zompvergeet-mij-nietje (*Myosotis laxa* ssp. *cespitosa*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stijl van de juist uitgebloeide bloemen korter dan de kelkbuis, 1,6-2,8 mm lang. Vruchtkelk tot ongeveer de helft ingesneden. Bloeiwijze zonder schutbladen in het onderste deel.

Stengel rolrond, met aangedrukte, naar de top gerichte haren.

Bloemkroon 2-5 mm in doorsnede.

Hoogte bloeiende plant

15 – 50 cm.

Bloeitijd

Mei – augustus

Levensvorm

Therofyt (eenjarig) of Helofyt (waterkant).

Standplaats

Vochtige weiden, oevers, drooggevallen zandbodem.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	0	0
●	1995 - ...	70	70



Moerasvergeet-mij-nietje (*Myosotis scorpioides* ssp. *scorpioides*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel rolrond tot stompkantig, meestal mat, met afstaande en aangedrukte, naar de top gerichte haren.

Onderste bladen aan de onderzijde met naar de bladtop wijzende haren.

Bloemkroon 4-8 mm breed.

Plant meestal zonder niet-bloeiende spruiten.

Hoogte bloeiende plant

20 – 80 (– 100) cm.

Bloeitijd

Mei – september

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of Helofyt (waterkant).


Standplaats

Oevers, sloten, vochtige weiden, moerassige bossen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	5	5
●	1971-'94	1	1
●	1995 - ...	146	146



Weidevergeet-mij-nietje (*Myosotis scorpioides* ssp. *nemorosa*)

Familie

ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel scherpkantig, glanzend, in het onderste deel met teruggeslagen haren bezet of kaal, soms bovenaan met naar de top wijzende aanliggende haren.

Onderste bladen aan de onderzijde met naar de bladvoet wijzende haren.

Bloemkroon 4-5(-6) mm breed.

Plant meestal zonder niet-bloeiende spruiten.

Hoogte bloeiende plant

15 – 50 cm.

Bloeitijd

Mei – augustus

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond) of Helofyt (waterkant).

Standplaats

Vochtige weiden, oevers, vochtige bosranden, moerassig hakhout.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970		
●	1971-'94		
●	1995 - ...		

Geen gegevens.